



**PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI)
GUÍA DE VACUNACIÓN DE NIÑOS**

Enfermedad que evita	Edades (Meses / Años) Optimas para la Vacuna						
	Recién nacida	2º mes	4º mes	6º mes	12 meses	18 meses	4 - 6 años
TUBERCULOSIS	BCG Unica ¹						
HEPATITIS B	HB RN ²	HB 1ª Dosis	HB 2ª Dosis	HB 3ª Dosis			
FORMAS DIARREA GRAVES / ROTAVIRUS		ROTA 1ª Dosis	ROTA 1ª Dosis				
POLIOMIELITIS		ANTI POLIO 1ª Dosis	ANTI POLIO 2ª Dosis	ANTI POLIO 3ª Dosis		ANTI POLIO 1º Refuerzo	ANTI POLIO 2º Refuerzo
ENFERMEDADES NEUMOCOCICAS	Inicio Sep 2013	NEUMO ^c 1ª Dosis	NEUMO ^c 2ª Dosis		NEUMO ^c Refuerzo		
DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B ³ Y LAS INFECCIONES INVASIVAS POR Hib (Meningitis)		Penta 1ª Dosis	Penta 2ª Dosis	Penta 3ª Dosis			
DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS						DPT 1º Refuerzo	DPT 2º Refuerzo
SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAPERAS					SRP 1ª. DOSIS		
INFLUENZA (FLU O GRIPE)				Flu 1ª. Dosis ³	Actualizar cada año		
FIEBRE AMARILLA (FA)					FA Grupo de Riesgo ⁴		

¹ La BCG debe aplicarse al nacimiento, de no ser así, lo más pronto posible.

² RN = Al recién nacido, dentro de las 48 horas después del parto.

³ Si es vacunado por primera vez, se aplicara una segunda dosis 4-6 semanas después, para edades de 6 meses a < tres años y enfermos crónicos y adultos mayores =>65 años.

⁴ Ver especificaciones del fabricante y epidemiología de la enfermedad; Viajeros Internacionales hacia areas endémicas, Edad =>9 meses, dosis única y refuerzo cada 10 años