



**Anticuerpos monoclonales contra VRS**

(1) Indicados en recién nacidos y lactantes (0-6 meses), excepto en hijos de madres que fueron vacunadas durante el embarazo, que recibieron la vacuna al menos 14 días previo al nacimiento. Indicado su uso en hijos de madres vacunadas inmunosuprimidas y en infantes con cardiopatía congénita aunque sus madres hayan recibido la vacuna.

(2) Indicados en lactantes (7 a 19 meses), solo grupos de riesgo.

**(3) Antipoliomielítica**

Vacuna IPV, 2 dosis (a los 2 y 4 meses)

Vacuna hexavalente, 1 dosis entre los 6 y los 18 meses

**(4) Antineumocócica**

3 dosis (2 + 1) a los 2, 4 y 12-15 meses

Se recomienda el remplazo de PCV13 por PCV15 / PCV20

**(5) Antimeningocócica ACWY**

2 y 4-6 meses, refuerzo a los 11-23 meses

Si el niño no fue vacunado durante el primer año de vida, 1 sola dosis

**(6) Antimeningocócica B**

2 y 4-6 meses, refuerzo a los 11-23 meses

**(7) COVID-19**

Entre los 6 meses y 4 años, en niños no vacunados o sin infección previa documentada (2 dosis de vacuna Moderna o 3 dosis de vacuna Pfizer).

Entre los 5 y 18 años se indica 1 sola dosis anual

**(8) Influenza/gripe**

1 dosis anual, a partir de los 6 meses de vida, con la vacuna disponible (trivalente o tetravalente), aprobada según recomendación de la OMS

Los niños entre 6 meses y 8 años que nunca fueron vacunados contra la gripe anteriormente, deben recibir dos dosis con un intervalo de 1 mes y, en años posteriores, una sola dosis.

**(9) Triple viral**

Primera dosis a los 12 meses, segunda entre los 18 meses y los 4 años

**(10) Hepatitis A**

1 única dosis

**(11) HPV**

A partir de los 9 años y antes de los 14, la población infantil (todos los géneros) deben recibir la vacuna cuadrivalente o novalente, según disponibilidad.

Los mayores de 14 años no vacunados previamente deben recibir 3 dosis.

Esquemas incompletos pueden completarse con vacuna novalente.

A pesar de que en los calendarios de algunos países ya se indica 1 sola dosis, la SLIPE considera que aún no existe suficiente evidencia que justifique el cambio de esquema.

**(12) Dengue**

Recomendada entre los 4 y 18 años, 2 dosis (intervalo de 3 meses).

**(13) Fiebre Amarilla**

Recomendada para Brasil, dos dosis, a partir de los 9 meses y hasta los 5 años. Los niños mayores de 5 años no vacunados deben recibir solo una dosis.